



المستشفى السلطاني قسم الطب النووي

4. بعد انتهاء المدة المحددة لوقف الرضاعة ، بإمكان
الأم أن ترجع للرضاعة بشكل طبيعي.

بدائل التغذية للطفل الرضيع أثناء وقف الرضاعة الطبيعية

- إذا كان بإمكان الأم أن تقوم بإخراج الحليب من ثديها
قبل بداية الفحص، فلها أن تفعل ذلك على أن تقوم بحفظ
الحليب في الثلاجة لكي تعطيه لطفلها في فترة إيقاف
الرضاعة.
- يمكن للأم أن تستخدم الحليب المركب (الفورملا) بدلا
من حليب الثدي خلال فترة إيقاف الرضاعة.
- إذا كانت فترة إيقاف الرضاعة قصيرة بحيث تتطلب
تفويت رضاعة واحدة فقط، ففي هذه الحالة بإمكان الأم
أن تعطي طفلها ماء فقط ، ولكن بعد ان يتم غليه ثم
تبريده مرة أخرى.

خطر تعرض الطفل للإشعاع

في الغالب يتعرض الطفل لكمية صغيرة من الإشعاع
ناتج عن حمل الأم لطفلها؛ ويستمر ذلك حتى تخرج
المادة المشعة من جسم الأم. لذلك (إذا كان بالإمكان)
ينبغي للأم أن تتجنب حمل الطفل بشكل وثيق لفترات
طويلة من الزمن خلال الساعات الست الأولى بعد
الفحص.

- *إذا كان لديك أية أسئلة ،يرجى التحدث مع تقني الطب
النووي أو طبيبك قبل بدء الفحص.
- *سوف يطلب منك التوقيع على استمارة موافقة لتعطينا
الإذن للقيام بالفحص.

-اسم الفحص الذي ستتعرض له المريضة : _____
-هل هناك حاجة إلى وقف الرضاعة الطبيعية بعد الفحص: نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>
- مدة إيقاف الرضاعة (إن وجدت) : _____ ساعة / يوم
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول الرضاعة الطبيعية بعد فحص الطب النووي ،يرجى الاتصال بقسم الطب النووي على هاتف رقم 24627069.

تأثير فحوصات الطب النووي على الرضاعة الطبيعية للأطفال

(ورقة معلومات للمريض)

كيف يعمل الطب النووي؟

فحوصات الطب النووي تساعد في تقييم وظائف
اعضاء الجسم، لذلك فهي تختلف عن فحوصات الأشعة
الأخرى التي تقوم بإظهار صور تشريحية مجردة
لأعضاء الجسم.
في بداية إجراء الفحص ، سوف يتم حقن المريض
بحقنة من مادة مشعة. عندما تصل هذه المادة الى
المنطقة الصحيحة في الجسم، سوف يتم التقاط صور
للمريض بواسطة جهاز خاص يسمى كاميرة جاما.

الطب النووي والرضاعة الطبيعية

ليست هناك حاجة لوقف الرضاعة الطبيعية بعد معظم
فحوصات الطب النووي لأن المادة المشعة التي تحقن
للأم المرضعة لا تصل غالبا الى حليب الأم. ومع
ذلك، فإن المواد المستخدمة (المتتبعة) في بعض
الفحوصات قد تصل الى حليب الأم في بعض الأحيان.
لهذا قد تضطر بعض الأمهات إلى وقف الرضاعة
الطبيعية لفترة من الوقت وذلك حفاظا على صحة الطفل
الرضيع من المواد المتتبعة.

سوف يقوم أحد التقنيين في قسم الطب النووي بشرح
هذا الموضوع للأم المريضة بشكل أكثر تفصيلا،
وسيبيلغها إن كان من الضروري أن تقوم بوقف
الرضاعة الطبيعية لطفلها بعد الفحص، وكم هي المدة
التي ينبغي أن تتوقف فيها الرضاعة، ومتى يمكنها أن
تستأنف الرضاعة.

إذا كان الفحص يتطلب إيقاف الرضاعة الطبيعية
للرضيع، ففي هذه الحالة على الأم أن توافق على إيقاف
الرضاعة قبل بداية الفحص؛ وفي حالة عدم موافقتها
سيتم الغاء الفحص.

إرشادات للأمهات اللاتي ينبغي لهن التوقف عن الرضاعة الطبيعية

1. إرضاع الطفل بشكل طبيعي قبل بدء الفحص.
2. بعد الفحص، على الأم أن تقوم بإخراج الحليب من
كلا الثديين في نفس الأوقات التي تقوم فيها عادة
بارضاع الطفل. وعليها أن تقوم بتكرار هذه العملية
حتى تنتهي المدة المحددة لوقف الرضاعة.
3. على الأم أن تتخلص من الحليب الذي تخرجه من
ثديها، وأن لاتعطيه لطفلها.